

Ergebnisse der Asklepios-Gruppe 2014: Einsetzen eines künstlichen Hüftgelenkes

Indikatoren	Bundesrate 2014	Referenzbereich/ Einheit	Asklepios Gesamtrate	Status	Bad Abbach	Bad Düben*	Bad Harzburg	Bad Tölz	Bad Wildungen	Birkenwerder	Crivitz*	Germersheim	Hamburg- Altona	Hamburg- Barmbek	Hamburg-St. Georg	Hamburg- Harburg	Hamburg-Nord	Hamburg- Wandabek	Hamburg- Westklinikum	Hohwald	Kandel	Langen	Lich	Lindau	Lindenlohe	Melsungen	Oschatz	Parchim	Pasewalk	Plau am See*	Radeberg	Schwalmstadt	Schwedt	Seesen	Seligenstadt	Weißenfels	Westerland/Sylt	Wiesbaden	
Fallzahl					571	445	504	64	178	272	135	96	24	21	25	40	48	32	292	686	53	104	201	134	257	41	311	69	145	96	56	93	91	32	37	62	22	181	
Indikation	Einsetzen eines künstlichen Hüftgelenkes bei erfüllten Indikationskriterien	>= 90,00 %	97,2	●	97,9	95,7	99,8	85,9	99,4	96,0	99,3	97,9	83,3	85,7	96,0	97,5	95,8	100,0	98,6	96,9	100,0	99,1	93,5	98,5	100,0	97,6	97,8	94,2	88,3	97,9	96,4	98,9	96,7	96,9	97,3	98,4	100,0	99,5	
Perioperative Antibiotikaprophylaxe	Perioperative Antibiotikaprophylaxe	>= 95,00 %	99,8	●	100,0	99,6	100,0	100,0	99,4	99,6	100,0	99,0	95,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,5	100,0	100,0	97,6	100,0	100,0	100,0	100,0	98,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Postoperative Beweglichkeit	Bestimmung der postoperativen Beweglichkeit nach der Neutral-Null-Methode	>= 95,00 %	98,9	●	99,8	97,5	100,0	100,0	98,9	99,6	100,0	97,9	75,0	100,0	100,0	97,5	100,0	100,0	99,3	98,4	100,0	99,1	96,0	100,0	100,0	92,7	99,4	92,8	100,0	100,0	100,0	100,0	98,9	96,9	100,0	98,4	100,0	100,0	100,0
	Beweglichkeit bei Entlassung	>= 95,00 %	99,7	●	99,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	94,4	100,0	100,0	100,0	97,9	100,0	99,7	99,4	98,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,4	100,0	100,0	99,0	100,0	100,0	97,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,5
	bei allen Patienten	nicht definiert %	0,3	●	0,4	0,5	0,0	0,0	0,6	1,1	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gehunfähigkeit	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E)	<= 5,63	0,7	●	1,1	1,2	0,0	0,0	1,7	3,3	0,0	0,0	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	bei allen Patienten	nicht definiert %	0,3	●	0,4	0,7	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,2	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gefäßläsion oder Nervenschaden	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E)	<= 6,76	1,1	●	1,2	2,3	1,4	0,0	0,0	1,2	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,5	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	bei allen Patienten	nicht definiert %	1,2	●	0,9	2,5	0,6	0,0	0,6	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	4,0	5,0	0,0	0,0	1,7	1,0	3,8	1,9	1,5	0,8	0,4	0,0	3,5	0,0	0,7	0,0	0,0	2,2	2,2	0,0	0,0	6,5	4,6	0,0	
Implantatfehlheile, Implantat-Dislokation oder Fraktur	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E)	<= 4,07	1,3	●	0,9	2,9	0,7	0,0	0,7	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	3,4	4,7	0,0	0,0	1,7	1,1	3,8	2,1	1,4	0,8	0,4	0,0	3,8	0,0	0,7	0,0	0,0	2,3	2,4	0,0	0,0	6,9	4,1	0,0	
	bei allen Patienten	nicht definiert %	0,2	●	0,4	0,2	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	4,2	0,0	0,3	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Endoprothesenluxation	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E)	<= 10,63	0,7	●	1,2	1,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	15,6	0,0	1,2	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	bei allen Patienten	nicht definiert %	0,4	●	0,0	0,0	0,0	1,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	1,0	0,8	0,0	0,0	1,0	5,8	0,7	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	2,7	1,6	0,0	0,0
Postoperative Wundinfektion	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E)	<= 6,37	0,8	●	0,0	0,0	0,0	3,5	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	2,0	1,5	0,0	0,0	0,0	2,2	9,6	1,4	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	6,6	3,1	0,0	0,0	
	bei allen Patienten	nicht definiert %	0,8	●	0,7	0,5	0,0	0,0	0,6	0,0	0,7	1,0	0,0	0,0	2,5	0,0	3,2	0,7	1,5	0,0	2,9	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,3	4,4	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	3,1	0,0	1,6	4,6	0,0	
Wundhämatome/Nachblutungen	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E)	<= 9,20	0,9	●	0,9	0,6	0,0	0,0	0,9	0,0	0,8	1,4	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	3,0	0,8	1,7	0,0	3,4	1,6	1,7	0,0	0,0	0,4	3,8	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	3,4	0,0	1,6	5,1	0,0	
	bei allen Patienten	nicht definiert %	0,7	●	0,4	0,0	0,0	1,6	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,4	1,9	2,9	1,0	1,5	0,4	0,0	2,3	1,5	0,7	1,0	1,8	1,1	1,1	3,1	0,0	1,6	4,6	0,0	
Allgemeine postoperative Komplikationen	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E)	<= 3,20	0,7	●	0,4	0,0	0,0	1,4	1,7	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	1,9	0,0	0,0	0,0	0,4	2,0	2,9	0,8	1,4	0,4	0,0	2,3	1,0	0,6	1,0	1,8	1,1	1,3	2,7	0,0	1,3	4,0	0,0	
	bei allen Patienten	nicht definiert %	1,4	●	0,9	2,5	1,4	0,0	1,7	0,0	0,7	1,0	0,0	0,0	4,0	10,0	2,1	3,1	0,0	1,3	1,9	1,0	2,0	2,2	0,4	0,0	2,3	1,5	0,7	0,0	1,8	0,0	1,1	3,1	2,7	3,2	9,1	0,0	
Re-Operation aufgrund von Komplikationen	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E)	<= 6,01	1,0	●	0,6	1,9	1,0	0,0	1,5	0,0	0,5	0,8	0,0	0,0	2,0	5,6	1,4	1,5	0,0	0,9	1,3	0,7	1,2	1,5	0,3	0,0	1,6	0,8	0,4	0,0	1,3	0,0	0,9	2,0	2,0	2,1	5,7	0,0	
	alle Patienten	= 0 %	0,2	●	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	1,6	0,0	0,0	
Sterblichkeit im Krankenhaus	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E)	nicht definiert	0,8	●	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	14,9	0,0	8,2	0,0	0,0	

● = innerhalb des Referenzbereiches  
 ● = Sentinel Event  
 ● = kein Referenzbereich definiert

\* Einrichtung der MediClin AG