

Ihr Termin

Tag der Voruntersuchungen
am _____, um _____ Uhr

Bitte melden Sie sich am Tag der Voruntersuchungen zunächst in der Patientenaufnahme im Eingangsbereich links. Danach kommen Sie in das Ambulante Aufnahmezentrum (AAZ) im Haus 1, Erdgeschoss, wo wir den weiteren Ablauf mit Ihnen besprechen. (Wegbeschreibung: siehe Plan rechts.)

Stationärer Aufenthalt am _____,
um _____ Uhr.

Bitte melden Sie sich am Tag der stationären Aufnahme direkt im Ambulanten Aufnahmezentrum. Die Unterlagen vom Tag der Voruntersuchungen haben wir bereits dort hinterlegt.

Bitte kommen Sie sowohl zu den Voruntersuchungen als auch zum stationären Aufenthalt nüchtern.

Bitte bringen Sie mit

- Einweisungsschein (keine Überweisung)
- Versicherungskarte
- Personalausweis
- Aktuelle Befunde
(Untersuchungsergebnisse/Filme auf CD)
- Herzschrittmacher-/ICD-Ausweis (falls vorhanden)
- den ausgefüllten Patientenfragebogen

Bitte kommen Sie zu der Untersuchung nüchtern. Das heißt 4 Stunden vor Ihrem Termin bitte nichts mehr essen oder trinken.

Information

Chefartzsekretariat
Daniela Wernicke
Tel.: 040 181887-3286
Fax: 040 181887-3287

Kontakt

Asklepios Klinik Nord - Heideberg

Abteilung für Innere Medizin II
Kardiologie & Internistische Intensivmedizin
Chefarzt Prof. Dr. med. Alexander Ghanem
Tangstedter Landstr. 400
22417 Hamburg
Tel.: 040 181887-3286
Fax: 040 181887-3287
Chefarztsekretariat-Kardiologie-Nord@asklepios.com
www.asklepios.com/nord

Online-Terminvergabe



Kardiologie

Vorhoffrerverschluss

Kathetergestützte Schlaganfallprophylaxe bei Patienten mit Vorhofflimmern

Informationen für Patienten

 **ASKLEPIOS**
Klinik Nord - Heideberg



Prof. Dr. med. Alexander Ghanem


Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Sie haben gemeinsam mit uns und Ihrem Arzt entschieden, dass zur Vorbeugung eines Schlaganfalls der Verschluss des linken Herzhohes mit einem Schirm durchgeführt wird. Wir führen diesen Eingriff mit guten Erfahrungen seit vielen Jahren durch; er kommt vor allem für die Patienten infrage, die aufgrund von Blutungsproblemen oder anderen schwerwiegenden Erkrankungen (z. B. fortgeschrittener Nierenschwäche) kein Marcumar® oder andere blutverdünnende Medikamente langfristig nehmen können.

Um Ihnen den Aufenthalt bei uns so angenehm wie möglich zu gestalten, möchten wir Ihnen vorab einen Überblick über den Krankenhausaufenthalt und die Behandlung geben.

Wir freuen uns, Sie in unserer Klinik aufnehmen zu können, und wünschen Ihnen rasche Genesung.

Ihr



Aufnahme

Am Tag Ihrer Aufnahme führen wir verschiedene Voruntersuchungen durch, die der Sicherheit des Eingriffs und der Bestätigung der Diagnosen dienen. Ihr behandelnder Klinikarzt wird noch einmal alle Fragen mit Ihnen durchsprechen.

Eingriff

Am Tag des Eingriffs dürfen Sie morgens noch trinken, aber nichts mehr essen. Während des Eingriffs im Herzkatheterlabor schlafen Sie, da wir währenddessen eine Ultraschalluntersuchung über die Speiseröhre (sog. TEE) zur genauen Steuerung durchführen. Ein Katheter wird über die Leistenvene in den linken Vorhof vorgeführt; über diesen Katheter kann dann gezielt das Vorhofohr mit einem speziellen Schirm verschlossen werden.

Nach dem Eingriff

Nach der Untersuchung wird die Zugangsstelle sofort wieder verschlossen. Während der Schirm einwächst, benötigen Sie für 3 Monate eine Therapie mit ASS und Clopidogrel, zwei Substanzen, die die Blutplättchen hemmen. Anschließend erfolgt eine weitere Untersuchung mittels TEE, bevor die Entscheidung getroffen wird, nur noch mit ASS 100 mg zu behandeln.

Da wir gemeinsam mit anderen Zentren klinische Studien über die Langzeiteffekte der Methode durchführen, werden wir Sie am Aufnahmetag um Erlaubnis bitten, in regelmäßigen Abständen nach dem Eingriff kurz mit Ihnen Kontakt aufzunehmen.



Wichtige Fragen & Informationen

- Besteht eine Medikamenten-, Kontrastmittel- oder Jod-Allergie?
- Ist eine Nierenfunktionsstörung bekannt?
- Liegt eine Störung der Schilddrüse vor?
- Nehmen Sie Marcumar®?
Der Quickwert muss mindestens 35% betragen bzw. der INR-Wert unter 2 sein – es kann sonst zu vermehrten Blutungen kommen.
- Nehmen Sie eines dieser Medikamente zur Blutverdünnung: Rivaroxaban (Xarelto®), Dabigatran (Pradaxa®), Apixaban (Eliquis®) oder Edoxaban (Lixiana®)?
Nehmen Sie diese Medikamente noch am Morgen des Vortages, danach nicht mehr – es kann sonst zu vermehrten Blutungen kommen.
- Haben Sie Diabetes?
Nehmen Sie Metformin/Glibenclamid/Glimipirid ein? Dann sollte es 2 Tage vor und 2 Tage nach der Katheteruntersuchung abgesetzt werden. Es kann zu Wechselwirkungen mit dem Kontrastmittel kommen.
- Alle anderen Medikamente (ASS, Clopidogrel, Blutdrucksenker usw.) sollten Sie auch am Tag der Herzkatheteruntersuchung einnehmen.
- Sie dürfen morgens vor dem Eingriff noch etwas trinken (Wasser oder auch Kaffee), jedoch nichts essen.